▨ প্রাপ্তিস্থান :- দুধ ও ডিমের কুসুমে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

● কার্যাবলী :-

১। অন্ত্রের উপোকে শক্তি বৃদ্ধি করে।
২। বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধ করে।
৩। ভ্রূণের সঠিক ভ্রূণে বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
৪। মাংসপেশীর দুর্বলতা বৃদ্ধি করে।

● অভাব জনিত রোগ :-

১। বন্ধ্যাত্ব অর্থাৎ সন্তান ধারণের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া।
~~২। বন্ধ্যাত্ব প্রতিরোধ করে~~
২। ভ্রূণের সঠিক ভ্রূণে মৃত্যু
৩। গর্ভপাত হয়ে সন্তান নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

◪ ভিটামিন - K

এর রাসায়নিক নাম - ন্যাপথোকুইনন বা ন্যাপথোকুইন। এই ভিটামিন হেমারেজ বা রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করে বলে একে অ্যান্টিহেমোরেজিক ভিটামিন বলে। এই ভিটামিন অন্ত্রে সংশ্লেষিত হয়।

● উৎস :-

▨ উদ্ভিজ :- বাঁধাকপি, পালংশাক, টমেটো, গাজর ইত্যাদিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

▨ প্রাণিজ :- দুধ, মাখন, মুরগির যকৃৎ নিঃসৃত তেল ইত্যাদিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

● কার্যাবলী :-

১। এই ভিটামিন যকৃৎ কে প্রোথ্রমবিন সংশ্লেষে সহায়তা করে।
২। রক্তে প্রোথ্রমবিন [illegible]

2. জলে দ্রবণীয় ভিটামিন :-

◪ ভিটামিন - B কমপ্লেক্স :

এই ভিটামিন জলে দ্রবণীয়, B কমপ্লেক্স B_1 বা থায়ামিন, B_2 বা রাইবোফ্লাভিন, B_3 বা প্যান্টো-থেনিক অ্যাসিড, B_4 বা কোলিন, B_5 বা নিয়াসিন ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

- **উৎস :**

▨ উদ্ভিজ :- টেঁকি ছাঁটা চাল, ডালের খোসা, আটা, কাঁচা শাক, বাঁধাকপি, বাদাম। অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদিতে এই ভিটামিন থাকে।

▨ দুধ, ডিম, পাঁঠার যকৃৎ, মাছ, মাংস ইত্যাদিতে এই ভিটামিন থাকে।

- **কার্যকারিতা :**

১। দেহের বৃদ্ধি হয়
২। রক্তকোশ গঠন হয়
৩। পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হয়।
৪। বেরিবেরি, পেলেগ্রা, অ্যানিমিয়া প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করে।
৫। স্নায়ুকোশ ও স্নায়ুগ্রন্থি কার্য ইত্যাদি।

- **অভাব জনিত রোগ :-**

১। বেরিবেরি আক্রান্ত ভিটামিন B এর অভাবে হয়। এই রোগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শোথ এবং পক্ষাঘাত হয়।
২। রক্তস্বল্পতা আক্রান্ত নলিক অ্যাসিড এবং B_{12} এর অভাবে হয়।
৩। পেলেগ্রা নিয়াসিন এর অভাবে হয়।
৪। চেইলোসিস বা মুখে ঘা এবং গ্লসাইটিস বা জিহ্বায় ঘা B_2 এর অভাবে হয়। এছাড়া মুখদাহ, অরুচি, চুল ঝরা, হাত পা জ্বালা ইত্যাদি।

ভিটামিন-C

এর রাসায়নিক নাম অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। এই ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয় তাই একে অ্যাসকরবিক ভিটামিন বলে। এই ভিটামিন তাপ সহ্য করতে পারে না তাই রান্না করা যায় না বা খোলা দুধে এই ভিটামিন পাওয়া যায় না।

- উৎস :-

উদ্ভিদজ : কমলা লেবু, আম, পেয়ারা, আমড়া, কাঁচামরিচ, কাঁচা শাক, টমেটো, ইত্যাদিতে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমানে থাকে, তাছাড়া উল্লেখ্য সবরকমের টকজাতীয় ফলে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

প্রাণীজ : এই ভিটামিন প্রাণীজ খাদ্যে খুবই কম থাকে, তবে কাঁচা দোহন দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, কাঁচা মাংস ও মাংসে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

- কার্যকারীতা :

১। লোহিত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা গঠনে সহায়তা করে। ২। স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে।

৩। দেহের ক্ষত প্রতিরোধে শক্তি যোগায়।

- অভাব জনিত রোগ :—

১। স্কার্ভি রোগ হয়।

২। রক্তহীনতা হয়

৩। অস্থি ও দন্তক্ষয় হয়

৪। রক্তে লোহিত কণিকা ও অনুচক্রিকার পরিমান কমে যায়।

৫। ক্ষত দ্রুত সহজে শুকায় না।

2.1

* Posture / দেহ ভঙ্গির বিকৃতি / অঙ্গ বিন্যাস :—

→ যে কোনো কাণ্ডের শরীরের বিভিন্ন অংশ গুলি স্বাভাবিক অবস্থানের থেকে সরে গেলে বা শরীরের বিভিন্ন অংশের জয়েন্টের অবস্থান স্বাভাবিক রেখা বিন্দু থেকে সরে গেলে তাকে দেহ ভঙ্গির বিকৃতি বলে।

যেমন— কাইফোসিস, স্কোলিওসিস, নকলী, বো-লেগ, স্ল্যাপফুট।

◪ কাইফোসিস (Kyphosis) :—

এটি একটি মেরুদণ্ডের বিকৃতি, মেরুদণ্ডের পোস্টেরিয়র অংশের পিছনের দিকে অবতল ভাবে বেঁকে যাওয়াকে কাইফোসিস বলে। এক্ষেত্রে মেরুদণ্ড পেছনের দিকে বেঁকে যায়, মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং রাউন্ড শোলডার দেখা যায়, দুর্বল দেহভঙ্গি বা ভুল দেহভঙ্গি গাইনের অভ্যাসের ফলে যাদের বয়সের পেশি কম শক্তি শালী তাদের এরূপ বিকৃতি দেখা যায়।

● প্রতিকার :-

বিকৃতির কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক) সুষম-অসুষম জনিত বিভিন্ন ব্যায়াম অনুশীলন।

খ) ওজন সহ বিশেষ কিছু ব্যায়াম,

গ) বিভিন্ন অবস্থায় সোয়াপন যেমন — সলোমন, ক্রোমন, ধনুকাসন, নৌকাসন (উপুর হয়ে শুয়ে) ইত্যাদি,

ঘ) আসনের সময়ে নিয়মিত আয়না, চিরুনি ব্যবহার করা।

টোনিক্যুক্ত বিন্যাসগুলি প্রতীত সচিত্রলেখে দেখানো।

☑ লর্ডোসিস (Lordosis) :-

- কোমরদেশের সামনের অংশটি যখন সামনের দিকে উঁচুল ভাবে বেঁকে যায় তখন তাকে লর্ডোসিস বলে। এক্ষেত্রে নিতম্বদেশ বেরিয়ে আসে সামনের দিকে বেড়ে যায়, পেটের পেশিগুলো দিকে পেশির সংকোচন ও অ্যাবডোমিনাল পেশির অস্বাভাবিক প্রসারণের ফলে এই বিকৃতি দেখা যায়।

● প্রতিকার :

প্রথমেই বিকৃতির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে তার পর প্রয়োজন মতো নিম্নে বর্ণিত ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করতে হবে।

= ব্যায়াম :

১। মাটিতে পিঠের দিকের পেশির ও তলপেটের পেশির উন্নতিতে সাহায্য করে এরূপ ব্যায়াম করতে হবে।

২। বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াসন যেমন- হলাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, সর্বাঙ্গাসন, নৌকাসন, ধনুরাসন (যা হয়ে থাকে), পাদহস্তাসন প্রভৃতির অনুশীলন।

৩। শ্বাসপ্রশ্বাস যুক্ত ব্যায়াম ও প্রাণায়ামের প্রয়োগ।

৪। অ্যাকুপ্রেশার ও ম্যাসাজ ও এর সুফল পাওয়ার

☑ নকনী (Knock Knees) :-

এই বিকৃতিতে পায়ের হাঁটুর ভেতরের দিকে প্রসারিত হয়ে বেঁকে যায় যে, দুই হাঁটু চলার সময় ভেতরের দিকে লেগে যায়। মাংসপেশী দুর্বল হয় এবং তাড়াতাড়ি পা ব্যথা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এবং দ্রুত পদক্ষেপের জন্য খুবই অসুবিধা হয়। এই জাতীয় বিকৃতির কারণ হল-

১। অতিস্থূল দেহযষ্টিরা ও হাঁটাচলা।
২। Flat Foot এর দরুণ শারীরিক ওজনের অবস্থান
৩। শরীরের আভ্যন্তরিক গঠন
৪। রিকেট

৫। ভ্যাগ্যাসনার্ভ [illegible]

● প্রতিকার :

নকশীর প্রতিকারের জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা হল — ভিটামিন-D ও ক্যালসিয়াম জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করতে হবে। রোদে চড়া ও লেগ এক্সারসাইজ করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে পায়ের তেতরের দিকে কোড়ালি উঁচু করতে হবে এবং জুতা পায়ে কলাপেড়া বাঁকানো মুলতে, বৃদ্ধাঙ্গুল দুই সন্নিকটে, প্রয়োজনে splint ও সার্জারিকেলে পরামর্শ জরুরী।

☑ স্কোলিওসিস (Scoliosis) :—

মেরুদণ্ড তার স্বাভাবিক অক্ষ থেকে অতিরিক্ত পার্শ্বে বেঁকে গেলে তাকে স্কোলিওসিস বলে। অবস্থাতে মেরুদণ্ড ডান বাম পাশের দিকে বেঁকে যায়, মেরুদণ্ড পাশে থেকে 'C' অথবা 'S' আকারের মতো হতে পারে। স্কোলিওসিস এর কিছু বেশ কয়েকটি দেখা যায়। —

● কারণ :

বিভিন্ন কারণে এরূপ বিকৃতি দেখা যায়,

১। পা-দুটির অসমান দৈর্ঘ্যের কারণে
২। অধিক ওজন তোলা বা বহন করার জন্য
৩। অস্থি-র জোড়া জোরা হলে
৪। অ্যারাক্নাইডিসা
৫। দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গি দূর্ণ-অভ্যাসের জন্য—
৬। জোনো দুর্ঘটনা বা আঘাতে
৭। জন্মগত কারণে

● প্রতিকার : বিকৃতি লক্ষণ না বাড়ার জন্য এ কারণে এ অনুসন্ধান করতে হবে। প্রয়োজনে অস্থি-বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে,

-ব্যায়াম করতে হবে।

-চিকিৎসকের পরামর্শ মত অস্থি সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে। বাড়ে ব্যায়াম অবশ্য করণীয়, ব্যায়ামের করে পা ভিতরে ঢোকানো হয় দিকে বাঁকা তার বিপরীতে হাত ঘুরিয়ে উপরে তোলা হয় এবং নামানো হয়

পায়ের বেঁকানোর অনুশীলন - মলদ্বার, ঢোকানো যে দিকে বাঁকা তার বিপরীত দিকে বালিশ দিয়ে শুতে হবে।

৩। ধনুক পা (Bow-Legs) :-

এই বিকৃতিতে পা দুটো ধনুকের মতো বাইরের দিকে বেঁকে যায় ফলে সোজা হয়ে দাঁড়ালে হাঁটু দুটোর মধ্যখানে ব্যবধানটি ফাঁকা হয়।

- কারণ :
  ১। দুর্বল দেহভঙ্গি বা হাঁটাচলা
  ২। রিকেট বা পোলিও
  ৩। অস্থির অবস্থান

- প্রতিকার :—
  ১। পায়ের বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ, Exercise করতে হবে
  ২। ওজন কম ব্যায়াম এর দ্বারা পায়ের ও কোমরের দিকে বেশি করে শক্তিশালী করতে হবে।
  ৩। নিয়মিত খেলাধুলা বা অ্যাথলেটিক্স চিকিৎসা অপরিহার্য।
  ৪। প্রয়োজনে অস্থির ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৪। চ্যাপ্টা পা (Flat Foot) :-

এই ধরনের বিকৃতির ক্ষেত্রে পায়ের পাতার দিকে বরাবর ধনুকাকৃতি উচ্চতা একদমই কমে যায় যে দাঁড়ালে পায়ের তলতের দিকটা মেঝেতে পুরোপুরি লেগে যায়।

- কারণ :-
  ১। দ্রুত দেহের ওজন বৃদ্ধি পেলে
  ২। অস্বাভাবিক ওজন

৪। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় হলেও বিশেষ কারণে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হয়।

● প্রতিরক্ষা :-

১। অন্তত সপ্তাহে তিনদিন সকালে গর্ভাবস্থা সভা চলতে হবে,
২। পায়ের বাইরের দিকে ভর দিয়ে হাঁটতে হবে,
৩। অবশ্যই অন্তত মিনিমাম ধরনের সুতা ব্যবহার করতে হবে,
৪। টোপোগ্রাফি জাতীয় কিছুর উপর দৌড় দেখে পায়ের গোড়ালি সার্কিটে রেখানোর চেষ্টা করতে হবে,
৫। সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে বসে (হাঁটু ভাঁজ না করে) পায়ের পাতা জমিনের দিকে ও জমিনের বিপরীত দিকে টান করতে হবে।
৬। হিলরেইজ (Heelraise) করতে হবে।